

# ПОСЛЕ ПРИВИВКИ

памятка о возможных реакциях  
на введение вакцин у детей и взрослых

**ВНИМАНИЕ:** если после вакцинации у вас возникли вопросы, позвоните в координационную службу по тел: 38-002-38 или наблюдающему вас врачу.

## ДЕТИ - прививки по национальному календарю вакцинации

<b>Профилактика коклюша, дифтерии, столбняка, полиомиелита, гепатита В, гемофильной инфекции</b> (ИНФАНИКС, АДС-М, АДС, АКДС, ЭНДЖЕРИКС В, ПОЛИОРИКС, РЕГЕВАК, ТЕТРАКСИМ, ПЕНТАКСИМ)	В первые 3 дня возможны болезненность и покраснение в месте инъекции, повышение температуры и недомогание.
<b>Профилактика полиомиелита</b> (ОПВ – живая вакцина, вводится через рот)	Изредка – кратковременные расстройства стула, в течение первых 3-х дней.
<b>Профилактика кори, краснухи, паротита</b> (ПРИОРИКС, ЖКВ, ЖПКВ)	С 5 по 14 день возможно повышение температуры, кашель, насморк, кожные высыпания, увеличение околоушных желез.

## ВЗРОСЛЫЕ И ДЕТИ - дополнительные прививки

<b>Профилактика гепатита А</b> (АВАКСИМ, ХАВРИКС, ГЕП-А-ин-ВАК)	В первые 3 дня возможны болезненность и покраснение в месте инъекции, повышение температуры и недомогание.
<b>Профилактика гриппа</b> (Инфлювак, Ваксигрип)	В первые 3 дня возможны болезненность и покраснение в месте инъекции, небольшое повышение температуры.
<b>Профилактика ветряной оспы</b> (ВАРИЛРИКС, ОКАВАКС)	Иногда повышение температуры и кожные высыпания с 5 по 14 день.
<b>Профилактика клещевого энцефалита</b> (ФСМЕ-Иммун /-Джуниор, ЭЦЕВИР)	В первые 3 дня возможны болезненность и покраснение в месте инъекции, повышение температуры и недомогание.
<b>Профилактика менингококковой, пневмококковой, гемофильной инфекции</b> (ПНЕВМО-23, АКТ-ХИБ, ПРЕВЕНАР, ХИБЕРИКС, Менинго А+С)	В первые 3 дня возможны болезненность и покраснение в месте инъекции, повышение температуры и недомогание.
<b>Профилактика заболеваний, вызываемых вирусом папилломы человека (ВПЧ)</b> (ГАРДАСИЛ)	В первые 5 дней возможны болезненность и покраснение в месте инъекции, повышение температуры и недомогание.

## ВЗРОСЛЫЕ И ДЕТИ - прививки для путешественников

<b>Профилактика желтой лихорадки</b> (Вакцина желтой лихорадки)	В первые 3 дня болезненность и покраснение в месте инъекции. Возможно повышение температуры до 39°C с 4-х по 10-е сутки (общей сложностью до 3-х дней).
<b>Профилактика брюшного тифа</b> (ВИАНВАК)	В первые 3 дня болезненность и покраснение в месте инъекции, повышение температуры.

## ОБЩИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ:

- При повышении температуры выше 38,5°C — привычные жаропонижающие (у детей не применяйте Аспирин). При сохранении дольше 3-х дней температуры или сильной реакции в месте прививки (боли, уплотнения, покраснения) требуется осмотр врачом (педиатром или терапевтом).
- Первые 5-7 дней после вакцинации воздержитесь от посещения общественных мест (кинотеатры, магазины и др.)
- Для детей при нормальной температуре и самочувствии — прогулки и купание в обычном режиме. Не вводите новые продукты в течение 3-х дней после прививки (при грудном вскармливании, это актуально и для мамы).
- В исключительно редких случаях могут возникать осложнения в виде судорог, сильной аллергической реакции (крапивница, отека Квинке). Эти ситуации требуют незамедлительного обращения в службу скорой помощи.